

Nhóm Fluoroquinolone (đường toàn thân và dạng hít)

Nguy cơ hở van tim

Vương quốc Anh: MHRA thông báo nguy cơ hở van tim đã được bổ sung vào thông tin sản phẩm của nhóm fluoroquinolone.

Nhóm fluoroquinolone (như ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin và ofloxacin) là các kháng sinh được sử dụng trong nhiễm khuẩn nặng, đe dọa tính mạng.

Nhóm fluoroquinolone trước đây đã có liên quan đến sự gia tăng nhỏ nguy cơ phình động mạch chủ và phẫu thuật động mạch chủ, tác dụng bất lợi nghiêm trọng trên cơ xương khớp và hệ thần kinh.

Một khảo sát ở châu Âu gần đây đã xem xét dữ liệu từ các nghiên cứu dịch tễ học và phi lâm sàng và chỉ ra sự gia tăng nguy cơ hở van tim sau khi sử dụng fluoroquinolone.

Fluoroquinolone chỉ nên được dùng sau khi đã đánh giá lợi ích – nguy cơ một cách thận trọng và đã xem xét các phương án điều trị khác trên bệnh nhân có nguy cơ như những người mắc bệnh về van tim bẩm sinh và người được chẩn đoán mắc bệnh về mô liên kết.

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cũng nên khuyên bệnh nhân đến cơ sở y tế ngay lập tức nếu có khởi phát nhanh triệu chứng khó thở, sưng mắt cá chân, chân hoặc bụng và mới khởi phát triệu chứng tim đập nhanh.

Tham khảo: Cập nhật an toàn thuốc, MHRA, ngày 17 tháng 12 năm 2020.

(*) MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency): Cơ quan quản lý thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe Anh

Nguồn dịch: WHO pharmaceuticals NEWSLETTER No.1 2021

Biên dịch: DS Phạm Thị Thảo

Người soạn

Khoa Dược

Lãnh đạo bệnh viện

DS Phạm Thị Thảo